

Pellier

110 47



n° 22.

Messieurs,



La préférence que mérite dans l'opération de la cataracte, l'extraction du cristallin sur son abaissement n'est plus un problème en chirurgie; tous les praticiens sont d'accord sur le point de pratique, mais en même temps qu'ils conviennent de l'avantage de la première méthode sur la seconde, ils sont forcés d'avouer qu'elle est sujette à un grand nombre d'inconvénients et que tous les jours on découvre dans le manuel de cette opération, des écueils contre lesquels on l'évite en suivant la méthode ordinaire.

Les occasions fréquentes que j'ai eues dans la pratique, et l'importance de son succès, m'ont obligés de porter toute mon attention à l'indécouvrir la source, et malgré les préjugés et la force de l'usage qui auroient pu me subjuguer et d'après les remarques essentielles que j'ai faites sur cette délicate opération, je crois l'avoir trouvée dans le défaut des instrumens que l'on a adopté à cette méthode, et que selon moi nous pourrions remplir les vûes que l'on s'étoit proposées. Plusieurs grands chirurgiens que je connois, pénétrés des mêmes vérités et rebutés par les grandes difficultés qu'ils ont rencontrées dans le manuel de feu M. DAVIEL et des suites fâcheuses qui sont survenues aux opérations faites par sa méthode ont été obligés d'y renoncer et se sont, ainsi que moi, appliqués à la recherche des moyens plus sûrs pour y réussir.

Cote orig. page 104.
H. Gueau

ARC 24 d. 105

2

Sans vouloir décider si leurs vûes ont été remplies esfans
chercher à insinuer que j'aie trouvé de la defectuosité dans
les découvertes qui m'ont servies de guide. Je diray seulement
en passant, qu'il me semble que l'on a été beaucoup plus
occupé de sa fin, que des moyens qui pouvoient la rendre
plus efficace. Son but consiste 1.^o à faire à la cornée une
incision circulaire en forme de croissant, de la grandeur de 6
à 8 lignes, à une demie ligne près de son bord, et de ménager
l'iris en la faisant. 2.^o à percer l'arachnoïde, pour
faciliter la sortie du cristallin, Lorsqu'une légère pression
qu'on fait sur le globe avec les doigts est insuffisante;
car on ne saurait trop prendre de précaution pour éviter la
Rupture de l'hyaloïde dont résulte toujours l'effusion
de l'humour vitré, et l'on sait que sa sortie peut
beaucoup troubler le manuel, et le rendre souvent
infructueux.

Pour remplir ces deux objets, on a imaginé différents
moyens que l'on a tâché de simplifier le plus qu'il a été
possible; sans faire attention que la nature des parties
que l'on entame, le changement de disposition qui
leur arrive naturellement ou accidentellement avant
ou après l'opération et les usages même auxquels elles
doivent servir après la guérison, sont autant de choses
qui paroissent exiger différents procédés, qu'on est
obligé de varier suivant la diversité des circonstances.

On distingue la cataracte par rapport aux parties
atteintes, en cristalline, et en membraneuse ou capsulaire.
Celle dernière se distingue par sa figure plane et mince,
au travers de laquelle le malade distingue encore
un peu les objets, mais comme à travers un voile;
elle est quelque fois adhérente à l'uvée et son adhérence
se manifeste par l'immobilité de la pupille, qui
est d'ailleurs rétrécie, et au bord de laquelle on remarque
de petits plis ou rides; l'iris est peint de couleurs

3

Singulieres et Extraordinaires: Cette espèce de cataracte³ me semble être plus susceptible de dépression avec laiguille en ouvrant la sclérotique, qu'en entamant la Cornée transparente: mais il est bon de s'en assurer par l'expérience; c'est à Elle qu'il faut s'en rapporter pour confirmer cette opinion.

La cristalline est trop formée pour en dire quelque chose; je me contenterai d'observer que c'est elle spécialement que l'on a eue dans l'opération et que c'est elle qui a donné naissance aux différents procédés imaginés pour son extraction.

M^r. Daviel, commençoit son opération par une ponction qu'il pratiquoit à la base de la cornée, avec un copece de lancette piri forme courbée et montée sur un manche fait à pans et qu'il agrandissoit avec un autre moins large, mouffé sur le bout et deux paires de ciseaux courbés sur leurs plats et sur leurs arêtes, il perçoit la capsule cristalloïde avec un copece de dard qu'il a ensuite courbé; il l'introduiroit dans l'œil à la faveur d'une très petite spatule avec laquelle il relevoit la portion coupée de la cornée.

La dextérité et la grande habitude avoit rendu ce manuel très aisé à M^r. Daviel, mais la multiplicité d'instrumens qui l'allonge considérablement et le rend d'une très difficile exécution, L'on fait proscrire.

M^r. De la faye, a imaginé d'ouvrir la cornée d'un seul coup avec un copece de bistoury à tranchant uni, un peu convexe sur le plat, que j'appellerai Kératome; mais la forme droite qu'il a donnée à cet instrument, le rend sujet à de grands inconveniens. (Ce que je dirai du Kératome de M^r. De la faye doit s'appliquer à ceux de M^r. Poyet, Sharp, et Vinet, qui ayans à peu près la même forme, sont susceptibles des mêmes inconveniens.)



La cornée est naturellement convexe en dehors et concave en dedans, ce qui forme ce petit vuide connu sous le nom de chambre antérieure; il n'en produit et entretenu que par le séjour de l'humour aqueux; Or moins il y aura de ce fluide, moins cet espace est grand et plus l'opération est difficile.

Dans l'état naturel, le centre de cette membrane est éloigné de la pupille d'environ une bonne ligne, cette distance diminue à mesure qu'on approche du ligament ciliaire, et s'efface même totalement lorsque cette liqueur s'en évacue.

Cela posé, je conviens qu'on peut avec ces espèces de Kératomes, ouvrir très promptement la cornée; ce qui est d'un très grand avantage; mais il faut avouer aussi que cette section ne peut être ni bien nette, ni bien ronde, et qu'elle est très souvent trop en biseau, d'où résulte une Cicatrice épaisse et informe, qui peut beaucoup gêner la vision.

Or en les faisant traverser la chambre antérieure, l'uvée, cette cloison percée qui est naturellement plane et flexible, se jette volontiers en devant et se glisse par dessous le bord tranchant, d'où arrive la lésion de cette membrane; qui est toujours fatale et même le danger augmente à mesure que l'humour aqueux s'écoule.

On concevra plus aisément comment cette blessure arrive, si l'on fait attention, que dans le moment du passage de cette espèce d'instrument, la portion inférieure de cette cloison percée se trouve moins élevée que le bord tranchant du Kératome; ce qui fait que souvent on l'ampute involontairement. Si pour éviter ces inconvénients, on jette en avant le tranchant, on refait alors à la cornée qu'une section trop jetée vers son centre, ce qui la rend trop petite et trop droite.

L'expérience m'ayant une fois fait reconnoître ces défauts qui résultoient de la forme de ce Kératome; j'imaginai de la changer. Celui dont je me sers depuis plusieurs années —

diffère de celui de M.^r Dela faye, en ce qu'il à la pointe figurée en as de pique, un peu allongée, et le tranchant rond en forme de croissant.

Mon but en donnant cette figure à la pointe de ce Kératome, fut d'en user comme d'un hameton pour reprimer les mouvemens de L'œil; mais si mon objet n'a été qu'imparfaitement rempli en cela, du moins à tit l'avantage d'empêcher que les mouvemens qu'on est obligé de lui faire faire, il ne glisse hors de la seconde ouverture, avant que la section ne soit totalement achevée; mais son tranchant à la faculté de s'éloigner du bord de la papille à mesure qu'il entre dans la chambre antérieure en de procurer une section plus nette, plus ronde, et plus éloignée du centre de la cornée; sans courir comme avec l'autre, le risque de blesser L'iris.



Pour l'intamer L'arachnoïde de M.^r Dela faye, à imaginé un second instrument qu'il appelle Kystitome, c'est un véritable pharyngotome en petit: Le mien en diffère par la pointe, qui est courbée à angle droit, fixée dans son manche et recouverte par une lame mouvante et lehanerée sur le bous; il entre dans L'œil bien plus aisément qu'aucun autre et parvient sans danger jusque sur cette Membrane délicate dont la route est angulaire, et en sort de même: il est en outre fort propre pour détruire les adhérences de la cataracte et d'ailleurs plus aisé à manier.

Pour faire L'opération, je fais assis le malade sur une chaise basse, devant un beau jour, la tête appuyée sur la poitrine d'un aide à qui je fais mettre une main sur le front et l'autre sous le menton pour la soutenir, après lui avoir appliqué mon Bandeau (que je nomme Diadème) et son crochet, dont l'usage est de soutenir seuls et sans aucun autre secours la paupière supérieure ouverte; j'approche les

les cuisses du malade que je passe entre les micunes; j'abaisse la paupière inférieure, je la soutiens avec les doigts et le globe avec le médius, que je porte dans le grand angle: je prends de la main gauche pour l'œil droit, et de la droite pour la gauche, mon Kératome, que je tiens comme une plume à écrire: j'en porte la pointe sur le bord de la cornée du côté du petit angle environ une demie ligne de distance de la sclérotique et vis à vis de la pupille, je traverse la chambre antérieure horizontalement et aussi promptement que le permettent les mouvements de l'œil, qui cherche toujours à fuir l'instrument, mais qui en ordonnant au malade de me regarder, se replace et s'enfile pour ainsi dire, de lui-même: Parvenu à l'autre bord, je perce la cornée une seconde fois à distance égale de l'albuginée, et alors je deviens imperturbablement maître des mouvements du globe: au même instant j'incline un peu le tranchant vers le bas, je le glisse doucement en allant et venant; je pose le doigt index sur la cornée vers la partie inférieure, pour le repousser luvée et terminer mon incision; ce qui s'exécute ordinairement en moins d'une minute.

La fonnée une fois ouverte, je prends mon Kératome, que je tiens presque comme une plume à écrire, je l'introduis dans l'œil jusque sur la capsule cristalline, j'en découvre la pointe en tirant avec le doigt médius la lamme mouvante qui lui sert de guide; je fais depuis cette mince tunique quelques petits mouvements circulaires pour l'entamer; je relâche le ressort et retire aussi tôt l'instrument, sans craindre de blesser aucune autre partie: Enfin je comprime légèrement le globe avec les doigts, tandis qu'avec une petite pince je soulève la portion coupée de la cornée pour faciliter la sortie du cristallin, qui rarement se fait longtemps attendre.

Cel est mon manuel dans l'extraction du cristallin; je n'emploie le plus communement que les deux instruments

7
dont j'ai parlé; mais de même qu'aux Lithotomistes, il faut
aux oculistes, des instruments auxiliaires, pour y recourir dans
Certains cas extraordinaires.

Une des Causes qui trouble le plus communement le
maneuve de cette opération, est l'instabilité du globe de
l'œil, soit qu'elle procède d'un mouvement convulsif des
muscles, soit qu'elle procède d'un mouvement convulsif
ait pour cause la grande frayeur que certaines personnes
et assez communement les jeunes gens, ont pour cette opération,
quoique par elle même très peu douloureuse: on ne peut
dans ce cas, trop prendre de précautions pour le fixer et
pour l'affujeter.

A cet effet, j'avois d'abord imaginé cette petite arde pique
éproignée que j'ai eu l'honneur de soumettre à votre jugement,
avec d'autres oculaires. En avril 1764. ces instruments
plongés dans la coque sur la sclérotique du côté du nez, fixe
parfaitement bien l'œil; mais les inconvénients qui
peuvent résulter de cette piqure superficielle, m'ont fait
imaginer des Kératomes de différentes espèces, dont les uns
sont cachés, d'autres à pointe moussée, droite, courbe, en
filées.

Il en est de très célèbres oculistes qui ont regardé l'instabilité
de l'œil comme un accident insurmontable, (ce qui
leur a fait renoncer à cette opération; D'autres tels que
M^{rs} Beranger de Bordeaux et Schouten hollandais,
se servent d'orthines, qu'ils introduisent dans la conjonctive
pour le fixer; mais l'inflammation qui peut en résulter,
survenant à cette blessure, empêchera toujours l'accomplissement
de cette méthode. M^r Le cat se sert d'un speculum de
Speculum oculi stable, qu'il appelle ophtalmostaté: je
rien connois pas bien l'usage, mais il en est à presumer
qu'il produit le même effet que les Anciens. C'est un cercle
un peu ovale très ouvert à un bout. Il est affujeter parfait
tement le globe de l'œil d'un côté qu'il l'expose, ce ne peut
être qu'en le comprimant; et d'un autre il doit rendre l'opération



est plus difficile et plus dangereuse en déterminant davantage l'iris à s'approcher de la cornée, et l'épulsion du vitré.

L'instabilité de l'œil, ne m'a plus fait obstacle depuis la confection de mes instrumens auxiliaires. Si quelque mouvement violent de l'œil fait quitter prise à mon Kératome ordinaire, lorsque la première ponction est faite; alors, comme l'humeur aqueuse se vacue et que le globe s'affaisse un peu, il seroit dangereux de piquer l'iris en faisant passer un instrument aigu à travers la chambre antérieure.

Dans ce cas, j'ai recours à un Kératome mouffe affilé et ou dépointe caché; que j'introduis dans l'œil à la faveur de la ponction déjà faite à la cornée et sans crainte d'interesser aucune partie.

L'extrémité du Kératome affilé étant une fois parvenue au bord opposé de la cornée, je prends de l'autre main un instrument pointu avec lequel je pratique à cette membrane une contre ouverture, pour faciliter la sortie du vitré, j'achève la section à l'ordinaire et l'aggrandis même s'il en est besoin, avec des ciseaux d'une espèce singulière, beaucoup plus commodes que ceux de M.^r David.

Pour faciliter l'entrée du Kératome caché qui est plus épais à l'extrémité que les autres, il est quelque fois nécessaire d'élargir un peu la ponction déjà faite à la cornée. Parvenu une fois à l'autre bord (ce qui se fait sans danger pour les parties intérieures de l'œil) j'en pousse la lamme pointue de hors; tandis que je retire la mouffe qui est mouvante en qui se de quaine à l'autre.

Celle là une fois sortie, je relâche le ressort que j'avois bandé avec le doigt du milieu et j'achève l'incision à l'ordinaire. Cet instrument que je regarde comme unique en son espèce, peut suffire seul pour faire l'extraction de la cataracte; on peut avec, ouvrir complètement la cornée et l'enlever la racine sans le secours d'aucun autre; il n'a d'autre inconvénient qu'un peu de difficulté à le manier et à le démonter pour le nettoyer.

Quelque fois le cristallin à peine sorti, une compression

219 9
Suffisante pour son expulsion, pourrais aussi faire sortir
l'humeur vitrée: alors je vais le saisir avec des pinces jusqu'à
dans son château et j'accélère ainsi sa sortie quand j'vois
celle du vitré la précéder: quoiqu'une légère effusion de cette
dernière humeur ne soit pas absolument contraire à la
vision, il faut néanmoins tâcher de l'éviter, parce qu'elle
trouble presque toujours l'opération.

On m'accusera peut être de vouloir multiplier les
moyens dans une opération qui doit être simplifiée
autant qu'elle peut en être susceptible. Ce seroit sans
doute bien à tort. Rien de plus simple que ma méthode
ordinaire; aussi c'est celle que j'emploie toujours, mais
aussi tôt qu'il se rencontre quelque cas extraordinaire,
dans lequel elle seroit insuffisante, j'ai recours à quel
qu'un de mes instrumens auxiliaires. C'est à eux que je
fais redevable du succès d'une infinité d'opérations, qui
sans les avantages que j'en ai tiré, eussent été infructueuses
pour les malades.

Aussi, c'est en variant mon manuel suivant les différentes
circonstances, que j'ai obtenu les plus belatans succès;
en guérissant constamment 8 ou 9 Cataraetes, bonne
espèce, sur dix. C'est sans doute réussir autant qu'il est
possible. Les praticiens savent qu'il est des opérations
qui ne manquent que par la constitution vicieuse de
certains sujets, souvent mal préparés ou mal conduits
en suite.

Je serois devoir joindre quelques faits de pratique
vérifiés par des confrères, tant pour étayer ce que
j'avance en faveur de mes instrumens que pour en déterminer
les époques, et distinguer par là dans ce qui a été dit et
produit sur ces objets par différents auteurs, ce qui peut être
être propre et personnel.

Des 1757. je me servis pour faire cette opération du
Kératome de M. Delafaye et d'autres instrumens connus.
j'ouvrais très promptement la cornée, les cataraetes



otées les malades distinguoient plus ou moins bien les-
objets; Les uns étoient le plus grand nombre, n'éprouvèrent
ni douleur, ni inflammation; Les autres, à qui l'uvée
avoir été blessée, éprouvèrent un grand nombre d'accidens,
et la cécité terminoit souvent la cure. Je cherchay à
découvrir la source d'un si fâcheux Evénement. A ceux cy,
dont l'iris avoit été blessé par le tranchant de l'instrument
Les organes après avoir souffert, devenoient difformes et
incapables de faire leurs fonctions. A ceux là je remarquois
tantôt un engorgement lymphatique aux cornées qui les
brûilloit et les rendoit louches; tantôt des filatrices
larges et épaisses qui formoient cette opacité, connue sous le
nom de Leucoma, et vulgairement dragon.

On concevoit aisément qu'en faisant à la cornée une
section trop en dedans ou trop jetée vers son centre, il
en résulte une cicatrice large, épaisse, et informe, capable
de produire l'opacité dont j'ai parlé.

Si pour éviter ces inconvéniens, on vient à l'entamer
l'uvée, il en survient d'autres plus fâcheux: C'est ce qui
me détermina à changer de méthode en donnant une autre
forme à mes instrumens. Les succès que j'en fis en
l'année 1763. ayant répondu à mes vûes, et été couronnés
des succès les plus heureux, me déterminèrent à les soumettre
à votre jugement en avril 1764.

Vous daignâtes applaudir à mes premiers essais, le
suffrage dont vous les avez honoré, me fait espérer le
même avantage pour les derniers.

Quel qu'excellente que fût dès lors ma méthode, il y
manquoit encore quelque chose. Dans les mouvemens
violens du globe, je ne pouvois faire à la cornée une incision
sans danger de blesser l'iris, à moins d'employer, pour le
fixer, l'as de pique prononcée; mais ces inconvéniens me

J'avois déjà fait proscrire, j'étois quelque fois obligé de retirer le Kératome hors de l'œil, et remettre l'opération à une autre fois; Ces désagremens me firent imaginer les différents Kératomes dont j'ai parlé, et qui ne sont que des instrumens auxilliaires. Je m'en servis maintenant avec succès, lorsque les circonstances l'exigent.

Entre plusieurs personnes que j'ai opérées à Nancy, il fut trouvé une occasion de se servir du Kératome à Stiles. voici le fait

En 1766. opérant le nommé Vauneson chamoiseur, au Collège Royal de médecine en présence de la faculté, et des maîtres en chirurgie: Après la première ponction faite à la cornée, il me fut impossible de faire la seconde parce que la pointe de mon Kératome ordinaire avoit plié ou cassé, alors j'eus recours à celui à stiles droit, et fis après l'avoir enfoncée à la place de l'autre, une seconde ouverture, qui me permit de le faire sortir du dedans qu'en dehors, et j'achevai mon incision à l'ordinaire. Je me rappelle qu'on peu plus long n'en a pas été moins satisfaisant; puis que le malade n'éprouva aucun accident et recouvrera promptement la clarté de cet œil, qui eût été perdu sans cette admirable ressource.

À Ligny au mois de Mars 1767. opérant une femme de deux cataractes en présence des Sieurs Gerard et laquerre chirurgiens de cette ville je fus obligé de retirer mon Kératome ^{ordinaire} après avoir fait la première ponction à la cornée de l'œil droit, parce que je craignois de blesser l'uvée; j'eui en substituer un dilatoire et pour faciliter la sortie, ~~de cette pointe~~, je fis au bord de cette Membrane une seconde ouverture que j'agrandis un peu avec mes ciseaux, et terminai à l'ordinaire mon opération, qui eut un succès aussi heureux qu'à l'autre œil; puis que La malade voit également bien de tous deux.



Ma méthode a déjà été adoptée par plusieurs chirurg. a qui l'expérience en a démontré l'abonté; elle a plu aux personnes de Lorr. en presence des quels j'ay opéré, non seulement à Paris lieu de ma résidence, mais encore dans plusieurs autres villes; Notamment à Metz en l'année 1765. et 1767.

La plus part m'ont décoré de leurs témoignage et m'honorer de leurs bienveillance; ce qui est un surgarant de leurs satisfaction. Ceux qui ont examiné les yeux opérés après guérison, ont remarqué qu'ils étoient sans difformité; que les cicatrices de la cornée étoient peu ou point sensibles, parce qu'elles étoient faites en croissant et près de son bord; et enfin que les pupilles avoient conservé leurs rondeurs naturelle, du moins dans le plus grand nombre; car il arrive quelque fois que cette ouverture se dilate et s'allonge au passage d'un gros cristallin solide.

Ce que j'ai dit en faveur de mes instrumens, suffit sans doute pour en faire connoître les avantages. une méthode simple et unie ne peut convenir dans tous les cas, il en est même souvent des occurrences où l'on est obligé de la varier. Or, de l'usage de mes instrumens adapté aux différentes circonstances, on peut espérer les plus heureux succès: ils ne sont sujets à aucun inconvénient, on peut s'en servir de la main gauche comme de la droite, sans être obligé de recourir pour fixer l'œil, aux moyens durs que l'on a jus qu'à présent mis en usage.

Trop heureux serai-je, Messieurs, si ces petites découvertes, pouvoient un jour devenir utiles à la chirurgie des yeux, et à l'humanité; Oiii je l'espère d'innocent, surtout si elles trouvent devant votre illustre tribunal, d'après duquel

J'ose déposer le fruit d'une culture de plus de dix années
consécutives.

Déjà pénétré des attentions de plusieurs membres distingués
de votre ~~illustre~~ ^{brillante} compagnie; J'ose dirai encore soumettre
à son jugement, ces dernières productions, comme analogues
aux premières.

J'ai l'honneur d'être très respectueusement,

Messieurs,

Votre très humble et très
obéissant serviteur

Le Juin 1867.

Sellier

M. le Chirurgien
à Bar Le Duc



